

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

## Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

### Comunicato di venerdì 22 maggio 2026

**Vite:** lo sviluppo vegetativo e fenologico della vite nell'ultima settimana a causa delle basse temperature è stato abbastanza limitato; al momento si osserva una fase compresa tra inizio e piena fioritura. In questa fase si deve utilizzare ancora un sistemico perché la vite è ancora molto suscettibile a infezioni. Per la **peronospora** si consigliano formulati a base di metalaxyl e folpet come Actlet F, Ridomil con folpet, ecc., oppure metalaxyl puro con l'aggiunta di un coprente. In alternativa Electis trio, o nelle vigne più avanti come sviluppo anche Zorvec vinabel o Viabria, ecc. Rispettare i turni tra gli interventi indicati in etichetta. Adottando quelli più brevi solo in caso di maltempo.

Per l'**oidio**, aggiungere zolfo bagnabile o liquido a 300-350 g/ml per ettolitro, e un sistemico come Domark o Galileo o Revysion.

Per i **biologici** è consigliato trattare preventivamente prima delle piogge, con rame e zolfo. 25-30 mm di pioggia determinano un dilavamento completo del trattamento. P

**Tignoletta:** al momento nella maggior parte delle zone non si segnala presenza di nidi di tignoletta. Si ricorda anche che in fioritura sono vietati trattamenti insetticidi.

**Melo:** Dopo l'ultima pioggia infettante di giovedì e venerdì scorso, si possono ritenere ormai concluse le infezioni primarie di **ticchiolatura**. Non è quindi più necessario intervenire curativamente dopo le piogge, ma si possono effettuare solo interventi preventivi di copertura, da ripetere dopo piogge consistenti, e in funzione della presenza o meno di malattia. In alcuni frutteti sono state segnalate macchie; nel caso si consiglia un trattamento con dodina, che ha azione bloccante. In assenza di macchie si possono usare coprenti come Delan o Simili, fluazinam (Banjo, Nando ecc.) o in questa fase ancora Fontelis o Sercadis.

Le catture di **carpocapsa** sono in calo, ma rispetto agli anni scorsi sono più diffuse nei frutteti; prestare attenzione e periodicamente controllare i frutticini. Fatto il trattamento con Coragen o Voliam nelle settimane scorse, non dovrebbero rendersi necessari ulteriori interventi. Nei frutteti dove sono stati trovati danni l'anno scorso si raccomanda però la massima attenzione, e nel caso fosse necessario un ulteriore intervento si possono utilizzare Affirm, oppure Trebon (efficace anche su cimice) o spinosad. Attenzione, è segnalata presenza di giovani di **cimice asiatica**, con anticipo rispetto alle scorse annate. Effettuare controlli e confrontarsi con un tecnico prima di decidere un trattamento. E' segnalata anche partenza di infestazioni di **afide lanigero**, in caso di forte presenza si può trattare il colletto delle piante con Pirimor o Aphox in miscela con bagnante