

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

## Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

### Comunicato di venerdì 3 luglio 2026

**Vite:** con questo andamento meteo il rischio di infezioni di **peronospora** è molto basso; si consiglia di adottare gli intervalli più lunghi indicati in etichetta, usando in questa fase ancora Ampexio, Pergado SC più rame, oppure Mildicut o altro prodotto a base ciazofamide con aggiunta di rame, oppure Electis R.

Per l'**oidio**, aggiungere zolfo bagnabile o liquido a 250-300 g/ml per ettolitro, con Vivando o simili, Kusabi o Cidely-Rebel top.

**Tignoletta:** come detto nel Notiziario tecnico, se si sono visti numerosi nidi di prima generazione; nelle aree soggette ad attacchi si può effettuare un trattamento in questi giorni con Coragen/Voliam, o tra una settimana circa con Affirm o spinosad.

Si notano frequentemente sulle foglie delle “macchie” che NON sono sintomi di Black rot, ma mine fogliari di *Antispila oinophylla*, un microlepidottero minatore fogliare; non causa danni reali, quindi non occorre trattare.



**Melo:** in questo periodo si consiglia di rinnovare i trattamenti **fungicidi** preventivi di copertura, da ripetere dopo piogge particolarmente dilavanti (50-60 mm), e in funzione della presenza o meno di malattia. Attenersi alle indicazioni dei referenti che ritirano e commercializzano la frutta, per i prodotti da utilizzare. In caso di utilizzo di Captano, attenzione a non usare zolfi, e distanziarli comunque di almeno 7 - 10 giorni per evitare problemi di fitotossicità. I trattamenti con zolfo andrebbero evitati quando le temperature superano i 28° C per evitare bruciature. **Attenzione ai tempi di carenza sulle Gala.**

La presenza di **afide lanigero** è in qualche caso molto abbondante. Con forte presenza e assenza di parassitizzazione si consiglia un intervento con Pirimor o Aphox in miscela con bagnante, oppure sali potassici di acidi grassi (es. Flipper) oppure Movento, consentito anche quest'anno con registrazione di emergenza.

**Carpocapsa:** in questi giorni si può ancora intervenire con Coragen o Voliam per la carpocapsa; se si sono già effettuati due trattamenti si può utilizzare Affirm. È possibile eventualmente a partire da questi giorni l'applicazione dei diffusori Ecodian del disorientamento. Attenzione, ci sono segnalazioni di presenza di adulti e stadi giovanili di **cimice asiatica**. I trattamenti sono di difficile applicazione per quanto riguarda le tempistiche; nel caso ce ne fosse bisogno, e soprattutto dove c'erano danni importanti gli anni scorsi, si può pensare, ad un intervento anche in modo localizzato sui bordi dei frutteti ecc., con un

piretroide abbattente come Trebon, Mavrik ecc. E' importante che le aziende facciano dei controlli frequenti. Anche in questo caso nella scelta delle molecole attenersi alle indicazioni di chi ritira la frutta per evitare residui indesiderati. Aggiungere un prodotto a base di calcio contro la butteratura.