

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 14 agosto 2026

Vite: con questo andamento meteo si possono allungare gli intervalli tra i trattamenti; in questa fase si consigliano dopo 18-20 giorni dal trattamento precedente, oppure dopo un dilavamento consistente a seguito di temporali, interventi solo con prodotti a base di rame (ossicloruro, idrossido o solfato). Aggiungere zolfo solo nei vigneti in zone tardive e non ancora ben invaiati per evitare oidio sul rachide, a dosi minime di etichetta. Per i trattamenti antibotritici fare riferimento alle indicazioni di chi ritira le uve, e al Notiziario tecnico n° 14 del 7 agosto.

Non si rendono necessari interventi insetticidi. Aggiungere eventualmente un concime fogliare a base di calcio.

Visto il perdurare delle condizioni di stress idrico e termico, con sintomi diffusi di sofferenza sulle piante, si consiglia di effettuare gli **opportuni diradi dei grappoli** in modo da non sovraccaricare le piante già stressate e consentire il regolare prosieguo della maturazione.

Melo: rinnovare i trattamenti **fungicidi** di copertura, da ripetere dopo piogge particolarmente dilavanti (50-60 mm) o irrigazioni sovrachioma. Attenersi alle indicazioni dei

referenti che ritirano e commercializzano la frutta, per i prodotti da utilizzare. **Attenzione a non fare deriva sulle Gala, che sono in fase di inizio raccolta.**

Carpocapsa: al momento non si rendono necessari interventi.

Cimice asiatica: le popolazioni di cimice asiatica e in qualche caso anche di cimice verde sono in aumento; si raccomanda di effettuare controlli, specie al mattino, e laddove ce ne fosse bisogno, soprattutto dove c'erano danni importanti gli anni scorsi, a fine raccolta Gala, o anche in questo periodo, stando attenti a non causare deriva, si può effettuare un intervento anche in modo localizzato sui bordi dei frutteti ecc., con un piretroide abbattente come Trebon o Decis jet , con 7 giorni di carenza. Anche in questo caso nella scelta delle molecole attenersi alle indicazioni di chi ritira la frutta per evitare residui indesiderati.

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura.