

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



FONDAZIONE
FOJANINI
DI STUDI
SUPERIORI

Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 19 giugno 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 12-14 giorni dal trattamento precedente, utilizzando Flint con aggiunta di 40-50 g/hl di Delan, oppure Captano. In presenza di infezioni in atto non ben controllate utilizzare Dodina oppure Delan con l'aggiunta di un sistemico ed eventualmente Thiopron. Non usare Flint in presenza di infezioni. Aggiungere calcio per la butteratura. Nei frutteti dove non si applica la confusione sessuale, se si sono visti segni di bacato facendo le operazioni di dirado manuale è il caso di effettuare un trattamento abbattente con Affirm oppure clorpirifos metile. Nei frutteti sottoposti a confusione mediante i gancetti del disorientamento è arrivato il momento di applicare i diffusori.

Vite: in questa fase l'accrescimento vegetativo è notevole e richiede la massima attenzione sia per la difesa antiperonosporica che per quella antioidica. Si può passare all'uso di prodotti citotropici contenenti dimetomorph come Forum R, oppure a Mildicut con aggiunta di rame, o Presidium one sempre con aggiunta di rame. In presenza di infezioni accorciare i turni di intervento, usando Forum R oppure un prodotto a base di cimoxanyl puro con aggiunta di rame, oppure Reboot che contiene zoxamide e cimoxanyl. Per l'oidio utilizzare Arius (ultimo anno di utilizzo), oppure Vivando o Kusabi con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido.

Effettuare il primo trattamento insetticida contro lo *Scaphoideus titanus* nei vigneti della bassa valle fino a Sondrio, prodotti utilizzabili: Steward, Epik, o un prodotto contenente thau -fluvalinate o clorpirifos metile.