

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 2 luglio 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 12-14 giorni dal trattamento precedente, in particolare dove sono attivi gli impianti di irrigazione; negli altri casi si possono allungare ulteriormente i turni di intervento in quanto sono previsti solo temporali. Usare Flint con aggiunta di 40-50 g/hl di Delan, oppure Captano. In presenza di infezioni in atto non ben controllate utilizzare Dodina oppure Delan con l'aggiunta di un sistemico ed eventualmente Thiopron. Non usare Flint in presenza di infezioni. Aggiungere calcio per la butteratura. Nei frutteti sottoposti a confusione della Carpocapsa mediante i gancetti del disorientamento è arrivato il momento di applicare i diffusori. Negli altri frutteti si consiglia di effettuare indicativamente settimana prossima l'insetticida con azione ovolarvicida sulla seconda generazione; prodotti consigliati: Coragen o Prodigy. Calypso e fosmet hanno azione più abbattente e andrebbero posizionati più avanti.

Vite: La presenza di **peronospora** e **oidio** nei vigneti è molto variabile a seconda dei turni di trattamento adottati e delle strategie; mediamente la situazione è buona, ma in diversi vigneti si osserva una presenza diffusa di macchie di peronospora sulla parte alta della vegetazione e in qualche caso isolato, anche di peronospora larvata

su grappolo. In questi giorni si osservano anche scottature su acino, per cui occorre valutare bene la situazione prima di decidere un trattamento. In questa fase per la peronospora si possono usare prodotti citotropici contenenti dimetomorph come Forum R, Quantum R ecc. oppure Mildicut con aggiunta di rame, o Presidium one sempre con aggiunta di rame o in alternativa Agron o Electis R. In presenza di infezioni accorciare i turni di intervento, usando Forum R oppure un prodotto a base di cimoxanyl puro con aggiunta di rame, oppure Reboot che contiene zoxamide e cimoxanyl. Per l'oidio utilizzare Arius (ultimo anno di utilizzo), oppure Vivando o Kusabi, o Flint con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, efficace anche su Black rot. In caso di attacchi forti di oidio effettuare due interventi ravvicinati con zolfo, preferibilmente liquido, ad alto dosaggio, o anche un trattamento con Cidely più zolfo.

Trattamenti insetticidi contro lo *Scaphoideus titanus* : nei vigneti della bassa valle fino a Sondrio, con obbligo di due trattamenti, **il secondo va eseguito dal 10 luglio al 21 luglio**. Nelle zone con obbligo di trattamento unico intervenire **entro il 7 luglio**.

Per i prodotti utilizzabili consultare il Notiziario tecnico. Nella zona di Buglio Villapinta ci sono catture molto alte di tignoletta, si può usare indicativamente settimana prossima un prodotto come Prodigy o Coragen, o effettuare il trattamento con i prodotti contro *Scaphoideus titanus* efficaci su larve di tignoletta, intorno al 15-18 luglio.