

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 16 luglio 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 15-18 giorni dal trattamento precedente, in particolare dove sono attivi gli impianti di irrigazione; negli altri casi si possono allungare ulteriormente i turni di intervento in quanto sono previsti solo temporali, stando attenti ai dilavamenti. Usare Flint (14 giorni di carenza) oppure Captano (21 giorni di carenza). I prodotti a base di dithianon e dodina non sono più utilizzabili su Gala per problemi di carenza. Nei frutteti non controllati con la confusione sessuale, se non si è trattato nelle scorse settimane per la Carpocapsa con Prodigy o Coragen, si consiglia di intervenire con Calypso, oppure un prodotto a base di fosmet (Spada ecc.) o clorpirifos metile. Attenzione: clorpirifos metile non è ammesso su carpocapsa per chi aderisce alla mis. 10.1 del PSR. I prodotti sono efficaci anche contro la cimice asiatica.

Vite: La presenza di **peronospora** e **oidio** nei vigneti è molto variabile a seconda dei turni di trattamento adottati e delle strategie; mediamente la situazione è buona, e in questi giorni si osservano soprattutto sintomi ormai vecchi su foglie e grappoli. In questa situazione si consiglia di allungare leggermente i turni di intervento, stando attenti però alle infezioni di oidio, diffuse in molti vigneti; per la peronospora si possono usare prodotti citotropici contenenti dimetomorph come Forum R, Quantum R ecc. oppure Mildicut con aggiunta di rame, o Presidium one sempre con

aggiunta di rame o in alternativa Agron o Electis R. In presenza di infezioni accorciare i turni di intervento, usando Forum R oppure un prodotto a base di cimoxanyl puro con aggiunta di rame, oppure Reboot che contiene zoxamide e cimoxanyl. Per l'oidio utilizzare Arius (ultimo anno di utilizzo), oppure Vivando, Talendo o Kusabi, o Flint con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, efficace anche su Black rot. In caso di attacchi forti di oidio effettuare due interventi ravvicinati con zolfo, preferibilmente liquido, ad alto dosaggio, o anche un trattamento con Cidely più zolfo.

Trattamenti insetticidi contro lo *Scaphoideus titanus* : nei vigneti della bassa valle fino a Sondrio, con obbligo di due trattamenti, il secondo va eseguito dal 10 luglio al 21 luglio. Nelle zone con obbligo di trattamento unico il termine ultimo per il trattamento era il 7 luglio.

Per i prodotti utilizzabili consultare il Notiziario tecnico.

Nella zona di Buglio Villapinta ci sono catture molto alte di tignoletta, effettuando il secondo trattamento con i prodotti contro *Scaphoideus titanus* in questi giorni, si dovrebbero colpire anche le larve della tignoletta.