

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 23 luglio 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 15-18 giorni dal trattamento precedente, in particolare dove sono attivi gli impianti di irrigazione; negli altri casi si possono allungare ulteriormente i turni di intervento in quanto sono previsti solo temporali, stando attenti ai dilavamenti. Usare Flint (14 giorni di carenza) oppure Captano (21 giorni di carenza). **Chi tratta dopo il 28 luglio non utilizzi più captano sulle Gala.** I prodotti a base di dithianon e dodina non sono più utilizzabili su Gala per problemi di carenza. Nei frutteti non controllati con la confusione sessuale, se non si è trattato nelle scorse settimane per la Carpocapsa con Prodigy o Coragen, si consiglia di intervenire con Calypso, oppure un prodotto a base di fosmet (Spada ecc.) o clorpirifos metile. Attenzione: clorpirifos metile non è ammesso su carpocapsa per chi aderisce alla mis. 10.1 del PSR. I prodotti sono efficaci anche contro la cimice asiatica. Chi tratta dopo il 28 luglio non utilizzi più fosmet e clorpirifos metile su Gala.

Vite: La presenza di **peronospora** e **oidio** nei vigneti è molto variabile a seconda dei turni di trattamento adottati e delle strategie; mediamente la situazione è buona, e in questi giorni si osservano soprattutto sintomi di peronospora ormai vecchi su foglie e grappoli. Si osserva però un **aggravamento degli attacchi di oidio**, per cui occorre calibrare gli interventi in base a questo. Dove gli attacchi sono sotto

controllo si può trattare dopo 15 giorni dal trattamento precedente, usando_Arius (ultimo anno di utilizzo), oppure Vivando, Talendo o Kusabi, con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, oppure solo zolfo. In caso di attacchi forti di oidio effettuare due interventi ravvicinati con zolfo, preferibilmente liquido, ad alto dosaggio, o anche un trattamento con Cidely più zolfo oppure Karathane star con una dose bassa di zolfo.

Per la peronospora si possono usare prodotti citotropici contenenti dimetomorph come Forum R, Quantum R ecc. oppure Mildicut con aggiunta di rame, o Presidium one sempre con aggiunta di rame o in alternativa Agron o Electis R. Si può utilizzare anche solo un formulato a base di rame ma in questo caso occorre prestare attenzione ai dilavamenti; dopo 30-40 mm di acqua il rame è completamente dilavato.

Nella zona di Buglio Villapinta ci sono catture molto alte di tignoletta, avendo effettuato il secondo trattamento con i prodotti contro *Scaphoideus titanus* nei giorni scorsi, si dovrebbero colpire anche le larve della tignoletta. Verranno forniti ulteriori aggiornamenti.