

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Servizio Difesa Fitosanitaria

Comunicato di lunedì 25 maggio 2020

Melo: Le infezioni primarie di ticchiolatura possono essere considerate concluse. A titolo cautelativo, per chi non avesse effettuato un trattamento coprente venerdì o sabato sulla pioggia di sabato sera, si consiglia di intervenire con un ultimo coprente in miscela con Score, altrimenti per questa precipitazione, di limitata entità, la vegetazione può ritenersi coperta. Occorre però fare attenzione al programma di irrigazioni e intervenire prima dei turni con un prodotto coprente. In questa fase sospendere l'uso di mancozeb e metiram, e utilizzare Delan oppure Fontelis o Sercadis.

Chi non avesse ancora effettuato il trattamento contro Carpocapsa deve intervenire al più presto con Coragen. Prodigy o Intrepid ormai non sono più consigliati perché agiscono sulle uova.

Vite: intervenire per ripetere il trattamento antioidico e antiperonosporico dopo 8-10 giorni dal precedente, se sono stati usati prodotti come Valis M, Valis F, Forum MZ o Pergado MZ. Si può aspettare qualche giorno in più se si è usato un sistemico, ma senza esagerare perché è stato notevole anche l'accrescimento vegetativo. In questa fase si consiglia un sistemico come Ridomil MZ, Ridomil combi, Electis trio o Zorvec Zelavin. Per i biologici un formulato a base di rame in modo da distribuire in questa fase 30-40 g/hl di rame metallo. Contro l'oidio si consigliano Domark o Thiocur in miscela con zolfo bagnabile o liquido a 250- 350 g/hl. Per i biologici esclusivamente zolfo bagnabile o liquido, a 350-400 g o ml/hl. Per ora non effettuare nessun trattamento insetticida.