

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Servizio Difesa Fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 8 luglio 2020

Melo: Si consiglia di ripristinare le coperture fungicide in base alle precipitazioni e ai turni di irrigazione, intervenendo ogni 15-18 giorni. In caso di sospetta o conclamata presenza di infezioni si può utilizzare un prodotto a base di dodina, come Syllit 65 con 40 giorni di carenza, altrimenti si consigliano captano, con 21 giorni di carenza, o Flint (14 giorni di carenza). Attenzione ai tempi di carenza per i trattamenti su Gala.

Cimice asiatica e carpocapsa: entro questa settimana effettuare il trattamento contro carpocapsa e cimice asiatica con Alsystem. Per i biologici si consiglia un trattamento a base di piretro efficace contro le neanidi, e poi eventualmente trattamenti con caolino a 2.5-3 Kg/hl possibilmente a volume normale

Vite: intervenire per ripetere il trattamento antiperonosporico e antioidico dopo 12-14 giorni da quello precedente. Al momento non si segnalano attacchi particolari di peronospora ma comunque si consiglia di rispettare le cadenze indicate in etichetta. In questo periodo si consiglia dimetomorf e rame (Forum R 3B, Quasar R, Quantum L con aggiunta di 150-200 g/hl di rame ecc.), oppure Mildicut sempre con l'aggiunta di rame, oppure Ampexio, Pergado R ecc. Per i biologici un formulato a base di rame in modo da distribuire 30-40 g/hl di rame metallo. Contro l'oidio si consigliano Kusabi oppure Vivando con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido. **È stato segnalato oidio su grappolo in diverse situazioni, per bloccarlo intervenire con zolfo bagnabile a distanza di 6-7 giorni, oppure zolfo in polvere con la solforatrice o Karathane star con l'aggiunta di 150-200 g/hl di zolfo bagnabile.** Per lo *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata, nelle zone con trattamento unico da Sondrio sx Adda a Tirano il periodo per il trattamento va dal 20 giugno al 5 luglio. Nelle zone con due trattamenti obbligatori, effettuare il secondo dal 3 al 20 luglio.