

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Servizio Difesa Fitosanitaria

Comunicato di venerdì 18 settembre 2020

Melo: trattamenti consigliati: in base alle zone, alle varietà e alle epoche di raccolta, consigliamo ormai solo trattamenti con Bellis (7 giorni di carenza) o Geoxe (3 giorni di carenza) limitando gli interventi alle varietà tardive. Per ora non si consigliano interventi per cimice asiatica.

Vite: I grappoli in questo periodo sono molto soggetti ad attacchi di marciume acido, conseguente a lesioni della buccia per fattori diversi, e favoriti dall'abbondante presenza di moscerini. Si consiglia di non ritardare troppo gli interventi antibotritici, qualora si fosse intenzionati ad eseguirli, ricordando 21 giorni di carenza per Switch e Scala, 14 giorni per Prolectus e 7 giorni per Teldor. **In questa fase è più importante garantire una tenuta maggiore della buccia intervenendo con Sali di rame**, specialmente dopo precipitazioni consistenti. Ci sono anche poltiglie con 7 giorni di carenza. L'effetto positivo sulla tenuta delle bucce è incrementato dall'aggiunta di zeoliti o bentoniti. Attenzione quando si usano argille conservate dall'anno precedente, evitare di usarle se sono state conservate in presenza di umidità.