

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitare 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 8 luglio 2021

Comunicato vite

Ripetere il trattamento antiperonosporico ed antioidico, dopo 12-14 giorni dall'intervento precedente, a seconda dei prodotti utilizzati. Le piogge di questa notte hanno apportato circa 25 mm in bassa valle e 20 mm anche in zona Ponte in Valtellina, mentre tra Castione e Sondrio e nel tiranese ha piovuto meno.

In questo periodo si consiglia uno di questi prodotti: Ampexio, Presidium one, Mildicut con aggiunta di rame, Forum R3B, Quasar R ecc. Aggiungere anche 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido e un antioidico come Kusabi o Vivando o Flint o anche Cidely/Rebel top. Attenzione alle infezioni di oidio, è importante arieggiare la chioma.

T Trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata: Nelle zone con obbligo di un solo trattamento, da Montagna a Tirano: dal **24 giugno al 4 luglio**.

Secondo trattamento, nelle zone con obbligo dei due trattamenti: dal 3 al 14 luglio.

Prodotti consigliati: Epik o Kestrel, Steward (non ammesso dalla misura 10.1 del PSR), oppure Mavrik o Sivanto. Consigliato Steward se occorre anche trattare la tignoletta.

Comunicato melo

Il contenimento della ticchiolatura appare buono. Si osserva in alcune situazioni una presenza di **oidio**. In questa fase si consiglia di usare Captano per la ticchiolatura. Attenzione all'uso degli zolfi perché devono essere distanziati da Captano di almeno 10 giorni altrimenti causano fitotossicità. Entro il fine settimana nelle zone della media valle, e il 15 luglio in alta valle effettuare il trattamento contro **Carpocapsa**.

Prodotti utilizzabili: Prodigy o Intrepid, o in alternativa Coragen o Alsystin.
Aggiungere un concime fogliare a base di calcio per la butteratura.