

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitare 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 22 luglio 2021

Comunicato vite

Ripetere il trattamento antiperonosporico ed antioidico, dopo 12-14 giorni dall'intervento precedente, a seconda dei prodotti utilizzati, delle precipitazioni e presenza di malattia.

Sono stati segnalate macchie d'olio su foglia nel tiranese, e anche sintomi diffusi su grappolo, che però sono dovuti a scottature e non a peronospora. Attenzione a non effettuare sfogliature eccessive in fascia grappolo.

In questo periodo si consiglia uno di questi prodotti: Forum R3B, Pergado R, Electis R, o in presenza di sintomi su foglia, cimoxanyl+rame. Aggiungere anche 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido e un antioidico come Vivando, Kusabi o Cidely/Rebel top. Attenzione alle infezioni di oidio, è importante arieggiare la chioma.

Secondo trattamento insetticida contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata, **nelle zone con obbligo dei due trattamenti: era da effettuare entro il 14 luglio, se non è stato fatto effettuarlo il prima possibile.**

Prodotti consigliati: Epik o Kestrel, Steward (non ammesso dalla misura 10.1 del PSR), oppure Mavrik o Sivanto prime. Ormai è stato raggiunto il picco di volo della tignoletta, nelle zone fuori confusione, peraltro con numeri bassi, e non occorre più trattare. Aggiungere eventualmente un concime base di calcio per favorire l'elasticità della buccia.

Comunicato melo

Interventi consigliati in questo periodo: captano (Merpan 80 WDG) a 130 g/hl, ogni 15-18 giorni, o dodina in caso di presenza di infezioni. **Attenzione alle Gala: non utilizzare più dodina e usare captano non oltre questi giorni, dopodiché si potrà**

utilizzare Geoxe per interventi di chiusura. Effettuare controlli sulla cimice asiatica e segnalare eventuali presenze particolari ai servizi tecnici. In caso sia necessario trattare utilizzare **Epik o Kestrel, con 14 giorni di carenza, oppure Trebon up con 7 giorni di carenza.** Attenzione alle carenze in caso di interventi su Gala. Decidere il trattamento in accordo con i tecnici. Aggiungere un concime fogliare a base di calcio per la butteratura (Butterfill o Alga ca o Caltrac e Actisel).