

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Servizio Difesa Fitosanitaria

Comunicato di venerdì 3 settembre 2021

Vite: visto il recupero nella colorazione delle uve (invaiaura) e la fase orami avanzata, si consiglia solo l'uso di un formulato a base di rame ossicloruro o solfato (Poltiglia Disperss ecc.) o miscele di idrossido e ossicloruro (Airone). Aggiungere 200- 250 g/hl di zolfo bagnabile o liquido solo dove l'invaiaura è più in ritardo. Approntare nei prossimi giorni il trattamento antibiotritico, con Switch o Kenja o Scala, o altri prodotti antibiotritici registrati, che hanno una carenza di 21 giorni tranne Prolectus che ha 14 giorni di carenza, Teldor 7 giorni e fluazinam (Banjo, Nando) 28 giorni. Aggiungere eventualmente zeolite. Per specifiche su altri antibiotritici fare riferimento al Notiziario sugli antibiotritici che è stato inviato in questi giorni.

Melo: trattamenti consigliati: su Golden e Stark non si consigliano più trattamenti di chiusura con captano perché in vista della raccolta i tempi di carenza non lo consentono; per trattamenti di chiusura compatibilmente con le esigenze delle strutture di conferimento (Melavi o privati), si possono considerare trattamenti con Geoxe (3 giorni di carenza) o Bellis (7 giorni di carenza) con tempistiche che dipendono dalle zone e dalle fasce altimetriche, facendo attenzione alla deriva sulle

Gala in fase di fine raccolta. Su Fuji, Pink Lady ed altre varietà tardive si può ancora utilizzare Merpan 80 WDG con 21 giorni di carenza.

Non sono segnalate casistiche particolari di danni da cimice asiatica, per cui al momento non si rendono necessari interventi insetticidi, come non sono consigliati insetticidi contro carpocapsa e Cydia molesta. Comunicare ai servizi tecnici eventuali presenze particolari di cimice.