

MIRTILLO: INFORMATIVA SETTIMANALE

comunicato del 20-05-2022

Stadio Fenologico (Duke):

Zone precoci: accrescimento dei frutti

Zone tardive: ingrossamento frutto

In tutte le zone e nelle varietà precoci e medie si osserva l'accrescimento regolare delle bacche. Sulle cultivar tardive come Overtime o i conilopidi (Rabbiteye), in alcune situazioni, si osserva ancora la presenza dei fiori. L'andamento meteo, con temperature estive e precipitazioni irrilevanti, impone molta attenzione alla disponibilità di acqua, che non deve mancare e deve essere gestita con parsimonia, senza sprechi. Il mirtillo va controllato più volte durante la settimana e, se le piante indicano deficit idrici, bisogna aumentare, se possibile, la durata dei turni. Inoltre è opportuno utilizzare un sistema irriguo a goccia, distribuendo acqua durante il giorno quando le radici delle piante sono più attive; l'erba nell'interfila va gestita con tagli ridotti per evitare che il terreno, nudo, si scaldi di più e perda più facilmente acqua per evaporazione; inoltre, l'erba in continua crescita, entra in competizione sottraendo acqua alle piante di mirtillo. Aspettiamo a tagliare; questo permette anche di ridurre i costi di gestione. In questa fase si possono completare le operazioni di concimazione sia a spaglio o con fertirrigazione, allo scopo di aumentare la pezzatura delle bacche. La concimazione va comunque conclusa entro il mese di giugno per favorire l'agostamento dei nuovi polloni e germogli ed evitare possibili danni invernali.

Per programmare una visita nella propria azienda, la Fondazione Fojanini si mette a disposizione il mercoledì, contattando il tecnico al 347-3768354.