

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitare 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 12 luglio 2022

Melo

Ticchiolatura: per chi avesse trattato da più di 10-14 giorni si consiglia di rinnovare le coperture. Effettuare controlli per verificare di non avere infezioni; in questa fase si consiglia captano (Merpan 80 WDG, 21 giorni di carenza); in caso di presenza di infezioni su foglie o frutti usare dodina, **ma attenzione non utilizzarla su Gala!**; per i **biologici** a fine infezioni primarie, usare rame a dosi basse per assicurare le coperture; se si è puliti è possibile usare anche bicarbonato di potassio (es. Vitikappa) in miscela con zolfi.

Carpocapsa: in caso di necessità o se non si è usato metossifenozone (Intrepid) o Coragen nelle scorse settimane, utilizzare Delegate o Affirm. Effettuare controlli di presenza di **cimice** o dei suoi danni, e in caso di necessità si consiglia un intervento con acetamiprid (Epik, Kestrel, max due trattamenti), preferibilmente sui bordi e in vicinanza a colture quali noccioli ed altre colture attrattive.

Vite

Nelle ultime settimane il rischio di **infezioni peronosporiche** è stato molto contenuto, tuttavia in modo sporadico si notano macchie d'olio diffuse soprattutto su femminelle; se le condizioni fitosanitarie sono buone rinnovare gli **interventi** dopo 12-14 giorni dal trattamento precedente, o allungare leggermente i turni compatibilmente col rischio anche di oidio, a seconda della tenuta dei formulati. In questa fase si consigliano Forum R 3B, Quantum L con aggiunta di rame, Pergado SC con aggiunta di rame, zoxamide + rame, o Mildicut o Daramun + rame. In presenza di macchie consistenti usare cimoxanil e rame. Per l'**oidio** aggiungere 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, e un prodotto come Vivando, Kusabi, oppure (specialmente in presenza di Black rot), Flint o Quadris.

Segnateci eventuali presenze importanti di Black rot.

Per i **biologici**, attenzione ai dilavamenti e rinnovare le coperture con rame e zolfo dopo 25-30 mm di acqua.

Le tempistiche per i trattamenti obbligatori previsti dalla normativa contro *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata, sono ormai concluse. Se non fosse stato eseguito tuttavia si raccomanda di effettuarlo il prima possibile. Al momento comunque non si riscontrano catture significative dell'insetto.

Si raccomanda soprattutto la massima attenzione alla comparsa di sintomi di Flavescenza dorata in vigneto; le piante vanno estirpate tempestivamente o in caso di dubbi segnalate al Servizio fitosanitario regionale o alla Fondazione Fojanini.