

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di mercoledì 10 maggio 2023

**Vite:** visto il perdurare delle condizioni di elevata instabilità meteorologica, si consiglia non appena le condizioni lo consentiranno, se non è ancora stato eseguito, di effettuare il primo trattamento antiperonosporico ed antioidico. Arrivando in ritardo si consiglia di utilizzare un prodotto contenente dimetomorf e rame, come Forum R 3B, Almada hydro ecc. In alternativa si possono usare Mildicut con aggiunta di rame, Pergado SC con aggiunta di rame, Enervin Top o Prevint top, possibilmente con aggiunta di fosfonato di potassio. In alternativa si può iniziare con un sistemico come Ridomil R o metalaxyl e Folpet (Actlet F ecc.). Per l'oidio aggiungere zolfo bagnabile a 300-350 g/hl o liquido eventualmente con aggiunta di Prosper o Spirox. Anche nel caso in cui sia già stato effettuato il primo trattamento, si consideri che da venerdì 5 ad oggi il dilavamento è stato notevole, per cui si consiglia, nel caso si sia usato solo un coprente settimana scorsa, di ripetere l'intervento appena possibile.

**Melo:** vista la bagnatura prolungata di questi giorni e i dilavamenti intensi, se è stato fatto un trattamento preventivo tra venerdì e sabato scorso si consiglia intervenire entro domani con un prodotto curativo (es. Score, attenzione max due interventi) in miscela con Delan (50 g/hl) oppure Banjo (70 ml/hl) o Nando maxi (100 g/hl). Se si è fatto un trattamento preventivo lunedì, si consiglia comunque domani di intervenire con una copertura perché sono ancora previste precipitazioni nei giorni seguenti. Attenzione, con Score massimo 2 interventi, in tutto massimo 4 con gli IBS. In caso di presenza di oidio si consiglia l'aggiunta di un prodotto a base di zolfo (es. Thiopron, Tiovit ecc.). Se non è ancora stato effettuato, si consiglia il trattamento aficida. Si

consigliano Pirimor o Sivanto per poter eventualmente utilizzare più avanti Epik contro la cimice asiatica. Effettuare l'insetticida possibilmente con tempo stabile e tagliare l'erba prima di utilizzare insetticidi.