

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di giovedì 10 agosto 2023

**Vite:** in questo periodo si consiglia di intervenire con prodotti ramati. Dove l'invasione è appena iniziata o non è completa, si consiglia di usare Mildicut o Manamid con aggiunta di rame, o in alternativa Electis R. Nelle zone più tardive sono stati segnalati sintomi di peronospora su grappolo anche recentemente, in questi casi si può utilizzare cautelativamente un ultimo cimoxanyl+rame. Nelle zone in cui l'invasione è più avanzata, basta anche un prodotto semplicemente ramato come Coprantol, Cuproxat, Poltiglia disperss ecc. Inutile e impossibile pretendere di avere le femminelle perfette con l'andamento di quest'anno, puntare a preservare la sanità del grappolo. Per l'oidio utilizzare zolfo bagnabile a 300-350 g/hl con aggiunta di un ultimo Vivando, Kusabi o Flint nelle zone più tardive. Per ora non si rendono necessari antibiotritici.

In diversi vigneti, soprattutto nella zona del tiranese, è stata segnalata presenza diffusa di ragnetto rosso. Effettuare controlli, ed in caso di presenza importante, visibile come bronzatura delle foglie, si consiglia un intervento acaricida adalticida con abamectina (es. Vertimec EC o altri prodotti, ad azione adalticida) prima che venga interessata anche la nuova vegetazione. Il principio attivo è consentito anche per chi aderisce alla mis. 10.1 del PSR. In alternativa si può provare anche ad utilizzare i Sali potassici di acidi grassi, come Flipper, utilizzandolo da solo e trattando a volume normale e garantendo una buona bagnatura. Questo prodotto è però efficace soprattutto sulle uova.

**Melo:** ripetere le coperture contro la ticchiolatura ogni 15-18 giorni in funzione dei dilavamenti delle piogge o dei turni di irrigazione. In questo periodo si consiglia Captano. Attenzione alla deriva sulle Gala perché Captano ha 21 giorni di carenza. Su Gala, che sono in imminente raccolta, non si consigliano trattamenti. I voli di Carpocapsa e la presenza di Cimice asiatica per ora sono molto limitati, per cui al momento non si consigliano trattamenti insetticidi. Verificare la presenza di eventuali danni da cimice sulle Gala durante la raccolta per valutare eventuali trattamenti sulle altre varietà, per le quali verranno forniti aggiornamenti.