

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 25 marzo 2024

Melo

Se non è ancora stata fatta la copertura contro la ticchiolatura, si consiglia di intervenire preventivamente prima delle piogge previste per domani e mercoledì, con Delan 70 WG o altro prodotto a base di dithianon, o in alternativa Polyram. Se non è ancora stato fatto, nelle zone più precoci effettuare l'aficida prefiorale prima che sia troppo tardi; prodotti consigliati Teppeki o Pirimor. Attenzione, con Pirimor o Aphox max 1 trattamento /anno indipendentemente dall'avversità.

Vite

Lo sviluppo vegetativo è molto disforme, con viti che si trovano in uno stadio compreso tra gemme gonfie/inizio ripresa vegetativa fino a prime foglioline distese. Sono stati segnalati i primi danni da nottue e geometridi (cumpas). Fare attenzione in questi giorni perché l'andamento meteo con temperature altalenanti sta determinando uno sviluppo non continuo della vegetazione, con forte rischio di attacchi nelle zone tardive. Qualora si volesse effettuare il trattamento insetticida, si consiglia di eseguirlo quando si iniziano a vedere i primi danni. Il prodotto consigliato è il Meteor a base di deltametrina, che però non è ammesso dai disciplinari ufficiali di difesa integrata. Aggiungere eventualmente olio bianco per aumentare la persistenza. Il trattamento ha maggiore efficacia se fatto nelle ore serali.

