

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 29 aprile 2024

Melo

La pioggia di domenica ha causato condizioni per una nuova infezione di ticchiolatura. Se si è trattato prima di venerdì 26 si consiglia di effettuare un intervento curativo entro mercoledì sera con un sistemico come Score o Revysion in miscela con un coprente. Per l'oidio si possono utilizzare zolfo, oppure Cidely, o, se si usano Luna experience o Sercadis o un sistemico come Revysion questi sono efficaci anche su oidio. A chi ha usato Sercadis, si consiglia di ripeterlo dopo 7 giorni con l'aggiunta di Delan o altro coprente. Max due trattamenti. Nei frutteti dove la fioritura è ormai finita e non ci sono più le api, si può effettuare il trattamento aficida postfiorale, con Sivanto o Closer o Pirimor. Utilizzabile anche Epik ma è meglio usarlo contro cimice asiatica. L'aficida Closer ha ottenuto l'inserimento nei disciplinari di produzione integrata, mis. 10.1 del PSR, per uso di emergenza come da etichetta, dal 1° marzo per 120 giorni.

Vite

In previsione delle piogge dei prossimi giorni, a chi effettua trattamenti con solo coprenti (rame, metiram, ecc.), e in particolare per i biologici, vista l'elevata predisposizione delle spore a germinare, si consiglia di effettuare il primo trattamento antiperonosporico e antioidico prima delle precipitazioni. A chi utilizza prodotti citotropici o sistemici (dimetomorf e rame, metiram e rame, mildicut con aggiunta di rame, oppure folpet + metalaxyl o cimoxanyl, fosetyl al ecc.), si consiglia di intervenire possibilmente entro questo fine settimana (4-5 maggio), o la metà della prossima (termine 8-9 maggio). Evitare di ritardare ulteriormente l'intervento. Per l'oidio si consiglia zolfo bagnabile o liquido a 200-

250 g/hl, eventualmente con spiroxamina (Prosper ecc.) oppure un sistemico come Domark 125 o Revysion. Aggiungere eventualmente un concime azotato per stimolare le piante.