

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 2 maggio 2024

Melo

La pioggia iniziata questa notte sta determinando condizioni favorevoli per un'infezione di ticchiolatura. Chi ha trattato nei giorni scorsi al momento è coperto, perché i millimetri sono stati pochi, ma l'andamento meteo è molto variabile e sono ancora previste piogge nei prossimi giorni e poi più consistenti la prossima settimana.

Chi ha trattato da non più di 3 giorni ha la vegetazione coperta, e al momento deve solo ripetere un intervento di copertura in previsione delle prossime piogge, con Delan o altro coprente. Se le piogge si protraggono anche domani, vale la pena però aggiungere un sistemico.

Chi ha trattato da più di 3 giorni, o anche venerdì scorso, deve intervenire il prima possibile, appena si apre una finestra di bel tempo, con un coprente in previsione delle prossime precipitazioni, ed aggiungendo un sistemico come Revysion o Score, anche entro domenica.

Nei frutteti dove la fioritura è ormai finita si può effettuare il trattamento aficida postfiorale, con Sivanto o Closer o Pirimor. Utilizzabile anche Epik ma è meglio usarlo contro cimice asiatica. L'aficida Closer ha ottenuto l'inserimento nei disciplinari di produzione integrata, mis. 10.1 del PSR, per uso di emergenza come da etichetta, dal 1° marzo per 120 giorni.

Vite

Le piogge di questi giorni possono essere predisponenti la prima infezione di peronospora. Tuttavia le temperature minime sono ancora basse. A chi effettua trattamenti con solo

coprenti (rame, metiram, ecc.), e in particolare per i biologici, vista l'elevata predisposizione delle spore a germinare, si consiglia di effettuare il primo trattamento antiperonosporico e antioidico il prima possibile. A chi utilizza prodotti citotropici o sistemici (dimetomorf e rame, metiram e rame, mildicut con aggiunta di rame, oppure folpet + metalaxyl o cimoxanyl, fosetyl al ecc.), si consiglia di intervenire cautelativamente entro la metà della prossima (termine 8-9 maggio). Per l'oidio si consiglia zolfo bagnabile o liquido a 200-250 g/hl, eventualmente con spiroxamina (Prosper ecc.) oppure un sistemico come Domark 125 o Revysion. Aggiungere eventualmente un concime azotato per stimolare le piante.