

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 10 maggio 2024

Melo

In questa fase si raccomanda ancora attenzione alle precipitazioni, che possono causare infezioni primarie di ticchiolatura. Per la prossima settimana è previsto tempo instabile con frequenti precipitazioni, pertanto si consiglia di rinnovare la copertura, se non è stato fatto in questi giorni, entro domenica mattina. Prodotti utilizzabili: Sercadis, Luna experience, Delan, Nando maxi. Aggiungere un antioidico. Sercadis e Luna hanno anche azione antioidica.

Se non è stato fatto si può effettuare il trattamento aficida postfiorente, con Sivanto o Closer o Pirimor. Utilizzabile anche Epik ma è meglio usarlo contro cimice asiatica. L'aficida Closer ha ottenuto l'inserimento nei disciplinari di produzione integrata, mis. 10.1 del PSR, per uso di emergenza come da etichetta, dal 1° marzo per 120 giorni. Effettuare lo sfalcio dell'erba prima di usare insetticidi. Sono iniziati i voli della Carpocapsa; verso fine settimana prossima, dopo le perturbazioni, si può iniziare nelle zone più precoci ad effettuare il trattamento, con Coragen o altro prodotto contenente clorantraniliprole.

Vite

Nei prossimi giorni ci sarà un aumento del rischio di infezioni di peronospora e oidio, visto anche l'aumento delle temperature e l'accorciamento dei tempi di incubazione. Ripetere i trattamenti dopo 10-12 giorni dal precedente, se si è usato un citotropico come dimetomorf e rame o simile nell'intervento precedente. Chi non è ancora intervenuto deve farlo senza aspettare oltre, entro domani o al massimo domenica mattina, con un sistemico come Sesto gold o Folpan gold o un citotropico come dimetomorf con aggiunta di rame o

metiram, ed eventualmente fosfito di potassio. Per l'oidio, usare zolfo bagnabile o liquido con aggiunta di un sistemico come Domark. Per i biologici, si consiglia di usare un prodotto ramato ad un dosaggio tale da distribuire 30-35 g/hl di rame (verificare il contenuto di rame dei singoli prodotti e fare una proporzione), il più possibile a ridosso di previsioni di precipitazioni. Dopo circa 30 mm di precipitazione il rame risulta dilavato. In caso di periodi particolarmente piovosi, consigliata l'aggiunta di un bagnante. Aggiungere zolfo bagnabile a 250-300 g/hl, o uno zolfo liquido come Thiopron, Tiolene, Heliosufre ecc. che contengono anche degli adesivanti.