

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 8 luglio 2024

Vite

La situazione attuale delle infezioni di peronospora nei vigneti è variabile; in alcuni casi le infezioni si sono fermate, in altri la malattia è ancora progredita o comparsa da poco, anche come larvata su grappolo.

Si raccomanda quindi massima attenzione, e si consiglia di non allungare le tempistiche di intervento oltre i 12 giorni, specialmente dove presente malattia.

In presenza di infezioni si consigliano ancora **dimetomorf e rame o cimoxanyl e rame, nei loro diversi formulati. In assenza di infezioni e si può passare a usare Pergado SC con aggiunta di rame oppure Mildicut/Daramun/Manamid/Back ecc. sempre con aggiunta di rame, o Electis R o zoxamide pura con aggiunta di rame.** Per i biologici: intervenire ripristinando le coperture. Con 20-30 mm di precipitazioni il rame è dilavato.

Oidio: sono state segnalate infezioni di oidio in alcuni vigneti, si consiglia di trattare con zolfi liquidi o bagnabili a non meno di 300-350 g/hl, con aggiunta di Cidely o Rebel top se sono presenti infezioni, o in alternativa Karathane star con una dose minima di zolfo. In assenza di infezioni usare Vivando o prodotti analoghi a base di metrafenone, oppure Kusabi, Flint o Sercadis. **Il secondo trattamento insetticida su *Scaphoideus titanus* va effettuato entro il 9 luglio.**

Per la strategia biologica: primo trattamento **dal 14 al 25 giugno 2024**, i successivi ogni 12-14 giorni. Per altre indicazioni su Scafoideo consultare il Notiziario vite n° 8.

Melo

In considerazione delle precipitazioni e bagnature e della presenza di ticchiolatura in alcune situazioni, nei frutteti trattati da più di 10 giorni si consiglia di rinnovare le coperture per la **ticchiolatura**. Come coprenti sono consigliati Nando maxi o Captano, o dodina, anche a seconda delle esigenze commerciali. Per i biologici: intervenire con formulati a base di rame a basso dosaggio, oppure bicarbonato di potassio (Karma, Armicarb ecc.), formulati a base di zolfo e olio essenziale di arancio dolce (Prev-am ecc.).

Carpocapsa: si osserva l'inizio dei voli di seconda generazione. Trattando in questi giorni è consigliabile aggiungere l'insetticida. Prodotti consigliati Coragen o vesticor, oppure Mimic o Delegate.

Cimice asiatica: si inizia ad osservare presenza di giovani di nuova generazione. Si può pertanto effettuare una prima applicazione insetticida con Epik o Kestrel, che è più efficace sugli stadi giovanili.

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura amara.