Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 / 513449
WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 26 giugno 2025

Vite

In queste ultime due settimane è aumentata la presenza di macchie di peronospora su vegetazione, e in qualche caso è uscita anche malattia sui grappoli; in altre situazioni non si segnala particolare malattia, ma si raccomanda comunque di non allungare i turni indicati in etichetta. In questa fase si consigliano: Pergado Sc + rame, Mildicut o altro prodotto contenente ciazofamide (Daramun, Manamid, Back ecc.) + rame, zoxamide+rame. **NON sono invece consigliati i prodotti contenenti fosetyl alluminio o fosfonati perché non lavorano bene su grappolo, e nemmeno altri sistemici.** In caso di presenza di malattia su foglia o grappolo aggiungere **cimoxanyl** puro (Sarmox ecc) oppure un prodotto contenente cimoxanyl e rame. In alternativa, vista la fase ancora erbacea, si potrebbero usare ancora Valis F oppure miscele di cimoxanyl e folpet.

Per l'**oidio,** usare Vivando o simili, oppure Kusabi, o in caso di presenza di Black rot, Flint o Quadris, sempre in miscela con zolfo bagnabile WG o zolfi liquidi (300-350 g o ml/hl). **Attenzione, con questo andamento meteo caldo afoso il rischio di infezioni di oidio è in aumento**!

Il secondo trattamento **contro *Scaphoideus titanus***, vettore della Flavescenza dorata della vite **va eseguito dal 26 giugno al 7 luglio**, per le aziende convenzionali (difesa integrata), mentre per i biologici i trattamenti successivi al primo vanno fatti ogni 12-14 giorni. Prodotti

utilizzabili: per il secondo trattamento un piretroide come Trebon o Mavrik. Per i biologici piretro. Per altre indicazioni si rimanda al Notiziario tecnico inviato tempo fa.

Melo

Sono state segnalate infezioni diffuse nell'ultimo periodo, soprattutto su foglia, a causa della notevole crescita fogliare e di qualche problema nella difesa dalle infezioni primarie in primavera. Fare quindi attenzione e ripristinare le coperture dopo 40-50 mm massimi di dilavamento e in presenza di rischio di precipitazioni. Prodotti utilizzabili, per la maggior parte delle linee di difesa quelli a base di Captano**, ma occorre rifarsi alle indicazioni di chi ritira le mele**.

Sono segnalati attacchi diffusi di **afidi**, sia afide grigio sia afide lanigero. In caso di problemi intervenire con Pirimor, Teppeki, oppure Sivanto. Se è presente in magazzino, quest'anno si può ancora usare Movento per l'afide lanigero. Non è invece più possibile acquistarlo. **In caso di infestazioni importanti di lanigero, si consigliano lavaggi con saponi molli di potassio (Flipper ecc.), bagnando bene la vegetazione a volume normale.**

Carpocapsa: sono stati trovate le prime catture di adulti di seconda generazione; in caso si intenda eseguire un trattamento con Coragen il periodo consigliato va da questo fine settimana fino a tutta la settimana prossima; con Affirm o Delegate si può ritardare un po' in quanto sono più efficaci sulle larve. In caso di applicazione dei diffusori del disorientamento, applicarli in questi giorni ed entro fine mese. Per i biologici raccomandato l'uso di virus della granulosi (Madex ecc.) a partire da questo periodo ripetendo i trattamenti in base all'etichetta.

Cimice asiatica: ci sono segnalazioni di adulti di cimice ed occasionalmente anche di ovature e giovani della generazione estiva; nel caso ce ne fosse bisogno, e soprattutto dove c'erano danni importanti lo scorso anno, si può pensare anche in modo localizzato, sui bordi dei frutteti ecc., ad un intervento con un piretroide abbattente come Trebon, Mavrik ecc. E' importante che le aziende facciano dei controlli frequenti.