

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 11 luglio 2025

Vite

Nell'ultima settimana la situazione fitosanitaria appare abbastanza buona; dopo una fase di comparsa di malattia anche su grappolo, al momento le infezioni sembrano stabilizzate. Si nota la presenza di macchie di peronospora, ma grazie anche all'andamento climatico non hanno avuto un eccessivo sviluppo. In questo periodo si consiglia di intervenire ancora entro e non oltre i 14 giorni, con Pergado SC + rame, oppure Mildicut o altro prodotto contenente ciazofamide (Daramun, Manamid, Back ecc.) + rame, zoxamide+rame (Electis R) ecc.

Anche per quanto riguarda l'oidio la situazione appare buona, e non ci sono stati segnalati nuovi casi di infezioni di black rot. Per l'oidio usare Vivando o simili, oppure Kusabi, o Cidely che ha attività parzialmente bloccante.

Il secondo trattamento **contro *Scaphoideus titanus***, vettore della Flavescenza dorata della vite **andava eseguito entro il 7 luglio**. In caso di ritardi eseguirlo il più presto possibile. Per le aziende bio i trattamenti successivi al primo vanno fatti ogni 12-14 giorni chiudendoli il più presto possibile perché sono efficaci sugli stadi giovanili. Prodotti utilizzabili: per il secondo trattamento un piretroide come Trebon o Mavrik. Per i biologici piretro. Per altre indicazioni si rimanda al Notiziario tecnico inviato tempo fa.

Melo

Fare attenzione alle infezioni di ticchiolatura, quest'anno piuttosto diffuse, e ripristinare le coperture dopo 40-50 mm massimi di dilavamento e in presenza di rischio di precipitazioni. Prodotti utilizzabili, per la maggior parte delle linee di difesa quelli a base di Captano, **ma occorre rifarsi alle indicazioni di chi ritira le mele.**

Sono segnalati attacchi diffusi di **afidi**, in questo periodo soprattutto di afide lanigero, anche se in diversi casi si osserva una buona parassitizzazione. In caso di problemi intervenire con Pirimor e in presenza di **infestazioni importanti si consigliano lavaggi con saponi molli di potassio (Flipper ecc.), bagnando bene la vegetazione a volume normale, e poi intervenire in seguito con Pirimor.**

Carpocapsa: nel caso non sia stato effettuato i primi di luglio, il trattamento insetticida va eseguito al più presto; in questa fase meglio usare Affirm o Delegate. In caso di applicazione dei diffusori del disorientamento, applicarli in questi giorni ed entro fine mese. Per i biologici raccomandato l'uso di virus della granulosa (Madex ecc.) ripetendo i trattamenti in base all'etichetta, ed eventualmente più avanti un trattamento con Laser.

Cimice asiatica: ci sono segnalazioni di adulti di cimice e da un paio di settimane anche di ovature e giovani della generazione estiva; nel caso ce ne fosse bisogno, e soprattutto dove c'erano danni importanti lo scorso anno, si può pensare anche in modo localizzato, sui bordi dei frutteti ecc., ad un intervento con un piretroide abbattente come Trebon, Mavrik ecc. E' importante che le aziende facciano dei controlli frequenti.