

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 22 agosto 2025

Vite

In questa fase si consiglia di effettuare solo trattamenti a base di rame, senza aggiunta di zolfo; aggiungere zolfo solo nelle zone in quota o comunque tardive, dove al momento l'invasatura è inferiore al 50%. Trattamenti antibotritici: valutare se effettuare l'antibotritico intorno ai primi di settembre, a seconda della posizione del vigneto, tipologie di cloni, tendenza dei grappoli a scoppiare. Attenzione ai tempi di carenza soprattutto per le uve destinate allo sforzato. Rapportarsi con le cantine a cui vengono conferite le uve.

Melo

A seconda dei dilavamenti causati dai temporali serali e dei turni di irrigazione, si consiglia di rifare una copertura con captano (attenzione 20 giorni di carenza), dove si sono misurati più di 30-35 mm tra piogge e irrigazioni; in seguito, chi non ha problemi di limiti di residui, può usare eventualmente a 8-10 giorni dal raccolto, Bellis oppure Geoxe. Rapportarsi comunque con chi ritira la merce per le opportune indicazioni. **Attenzione a non fare deriva sulle Gala in fase di raccolta.**

Carpocapsa: mediamente la situazione al momento è buona, nel senso che nei frutteti trattati regolarmente non ci sono catture e non si vedono rosure; in alcune situazioni, specialmente nei frutteti trattati poco, o in prossimità di questi, si nota una presenza

maggiore; in caso di necessità, stando attenti a non fare deriva sulle Gala, nelle zone critiche si può effettuare un trattamento con Affirm o Delegate (per entrambi 7 giorni di carenza).

Cimice asiatica: questa settimana c'è stato un incremento di catture di forme adulte; contro queste gli insetticidi sono poco efficaci; per effettuare un eventuale trattamento con deltametrina (Decis ecc.) o altri piretroidi sarebbe meglio aspettare che ci sia un aumento di presenza di stadi giovanili. Verranno date ulteriori indicazioni. Effettuare comunque frequenti controlli per valutare la situazione.

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura.